

Verdacht auf Schlaganfall? -> FAST Test (dient der schnellen Beurteilung)

1 einziges Anzeichen genügt!



Face = Gesicht

Den Patienten zum Lächeln auffordern

-> Asymmetrie im Mundbereich, Erschlaffung?



Arm = Arme (Unfähigkeit die Arme normal zu heben)

Bitten Sie den Patienten die Arme mit geschlossenen Augen horizontal zu heben (und die Handflächen zu drehen)

-> Sind beide Arme auf gleicher Höhe?



Speech = Sprache (Sprachschwierigkeiten)

Der Patient soll einen einfachen Satz nachsprechen

-> Vorliegen einer Sprach- oder Aussprachstörung?



Time = Zeit (Äußerste Dringlichkeit)

Den Moment festhalten wann die ersten Symptome auftraten

FAST - TEST

Maßnahmen bei Verdacht auf

Durchzuführen bei JEDEM Patienten mit:

- einer Sprachstörung und/oder
- einem Sensibilitätsdefizit und/oder
- Kraftdefizit, plötzlich oder beim Aufwachen

Anamnese:

- Wo liegt das Problem (FAST- Test) ?
 - Uhrzeit Beginn der Symptome, Dauer:
 - Zeitrahmen < 4h30 -> mögliche Fibrinolyse
 - Zeitrahmen = 6 Stunden -> Thrombektomie
 - Umstände?
 - Dyspnoe?
 - Herzprobleme in der Vorgeschichte, Bluthochdruck?
 - Neurologische Probleme in der Vorgeschichte?
-
- Durchführung der Bilanzen + Fast-Test
 - Messung des Blutzuckers
 - O2-Verabreichung gemäß dem Sauerstoff-Algorithmus
 - Stabile Patienten- und O2-Sättigung = oder < 94 %
 - Ist der Patient laut ABC nicht kritisch: Benachrichtigen sie das Zielkrankenhaus (Fast - positiver Patient) und bringen sie den Patienten hin
 - Ist der Patient laut ABC kritisch: Medizinische Verstärkung anfordern
 - Flachlagerung beim Transport (Ausnahmen: Bei Problemen der

Transport rapide vers hôpital si délai < 4h30
car séquelles réversibles