

Kontrolle der Blutungen

Visualisierung der Wunde

Direkten Druck auf Wunde
ausüben

Lagerung anpassen

Wundverband anlegen

- 1.Wahl: **Druckverband**
2.Wahl: **Abbindung (Tourniquet)**



Starke Blutungen an Armen und Beinen:

- direkter Druck und/oder
- Abbindung



Starke Blutung in Achsel- oder Leistengegend:

- "woundpacking" und/ oder
- direkte Druckausübung auf Wunde



Starke innere Blutungen (Rumpf):

- Unmöglich am Einsatzort zu kontrollieren
- Dringender Abtransport ins Krankenhaus

SCHOCKZUSTAND/ KRITISCHER PATIENT/BLUTUNG

Schocklagerung

O₂ mit

Hochkonzentrationsmaske


Zudecken

Notarzt

Kontrolle der Blutungen

Kontrolle von äußeren Blutungen

(komprimierbar)



¹ Oder Amputation oberhalb des Handgelenkes oder Knöchels

² Halsbasis, Achselhöhle, Leistengegend, Perineum

³ Handbreit, oberhalb der proximalen Wunde, nicht auf Gelenken.- Im Zweifelsfall an der Wurzel der Extremität.

Maßnahmen bei inneren Blutungen

(keine direkte Druckausübung möglich)

